



Bulletin technique des Chambres d'Agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin


N°16 du 12 juin 2012 - 1 page

# **GRANDES CULTURES**

## MAÏS

### **Pyrale**

Le développement de la pyrale se déroule, en ce début de campagne, selon une dynamique parfaitement calée sur la moyenne des 10 dernières années.



Evolution de la nymphose en 2012

A ce jour, la nymphose atteint 35 % à Wiwersheim. Les conditions climatiques actuelles sont peu favorables à l'activité des papillons. En cage de vol, le premier adulte a été signalé hier. Le retour prévu

#### d'un temps plus chaud (et orageux) d'ici la fin de semaine devrait permettre d'observer le démarrage effectif du vol de la pyrale dès le week-end prochain. Ces températures, si elles se confirment, devraient être favorables au début de la ponte de la pyrale.

**Préconisations** 

<u>Trichogrammes</u>: les préconisations des précédents bulletins sur le positionnement des

trichogrammes
restent
d'actualité, même
si avec les
températures
actuelles, la ponte
pourrait être
retardée de
quelques jours.

Signalons que les trichogrammes sont particulièrement sensibles aux fortes chaleurs et la mortalité augmente avec les températures trop fortes. Evitez donc les stockages dans des endroits où la température pourrait augmenter rapidement (en particulier les voitures ou camionnettes exposées au soleil).

#### <u>Traitement insecticide</u> :

A ce jour, il est bien sûr trop tôt pour envisager un traitement insecticide parfaitement adapté au cycle de la pyrale. Par contre, avec le retour de la chaleur, les maïs les plus développés seront au stade « limite passage tracteur » d'ici quelques jours. Si vous avez décidé d'intervenir par ce mode d'application, le moment de l'intervention est davantage lié au stade du maïs qu'à la dynamique de la pyrale.

## MAIS

**Pyrale** 

#### **BLE D'HIVER**

Bonnes conditions de remplissage ... pourvu que ça dure.

## **BLE D'HIVER**

Les parcelles de blé sont maintenant toutes en phase de remplissage du grain et bénéficient de bonnes conditions (températures non échaudantes et pluviométrie régulière). Les grains sont encore au stade laiteux et il reste également du chemin à parcourir avant d'atteindre la maturité physiologique.

Chambre d'Agriculture Région Alsace - 2 rue de Rome - BP 30 022 Schiltigheim - 67013 STRASBOURG CEDEX
Directeur de publication : J.P. BASTIAN - ISSN : 2101-5406 - - © Toute reproduction même partielle est soumise à notre autorisation.

Les Chambres d'Agriculture du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont agréées par le Ministère chargé de l'Agriculture pour leurs activités de conseil indépendant à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques sous les numéros d'agrément suivants : AL 10832 pour la Chambre d'Agriculture du Bas-Rhin et AL 10833 pour la Chambre d'Agriculture du Haut-Rhin.

 $\int_{0}^{3}$ 

4° JO 43386



